VACINAÇÃO A NÍVEL DE PUERICULTURA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PELOTAS/RS

LEWINSKY, G. P.[1]; MOSTARDEIRO, L. R.[2]; PEREIRA, F.W.C.[1]; BELLINI, A. D.[1]; MENDES, M. M.[2]
1.Universidade Luterana do Brasil
2.Universidade Católica de pelotas

INTRODUÇÃO

As vacinas são preconizadas pelo calendário de vacinação da criança tendo o intuito de protegê-la na fase em que a ocorrência de doenças é mais comum e grave. Algumas vacinas, dadas na infância, poderão proteger ao longo de toda a vida, como a contra Hepatite B.

OBJETIVO

Analisar o registro das vacinas nas crianças, de 0 a 54 meses, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora de Fátima, Pelotas/RS.

METODOLOGIA

É um estudo exploratório e descritivo de abordagem quantitativa com delineamento transversal. Foram analisadas 164 fichas de puericultura.

RESULTADOS

Analisando as 164 fichas de puericultura, o resultado encontrado foi: apenas 94 (57%) das crianças de 0 a 54 anos atendidas na UBS estavam com o esquema vacinal em dia.
Ou seja, mais de 40% das crianças não foram devidamente vacinadas.
Isso é preocupante, uma vez que a vacinação é de extrema importância na prevenção de doenças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, além de intensificar as campanhas de vacinação na cidade, é necessário orientar todos os pais afim de que o maior número de crianças tenham o esquema vacinal completo. Atingir esse objetivo significa uma menor incidência de doenças.

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 12 MESES DE IDADE										
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses
BCG ID[1]	Dose única										
Hepatite B[2]	1ª dose		2ª dose				3ª dose				
Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa)[3]			1ª dose		2ª dose		3ª dose				
Haemophilus influenzae b[4]			1ª dose		2ª dose		3ª dose				
Poliomielite (vírus inativados)[5]			1ª dose		2ª dose		3ª dose				
Rotavírus[6]			Duas ou três doses, de acordo com o fabricante								
Pneumocócica conjugada[7]			1ª dose		2ª dose		3ª dose				
Meningocócicas conjugadas[8]				duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada							
Meningocócica B[9]				1ª dose		2ª dose		3ª dose			
Febre amarela[11]										1ª dose	
Hepatite A[12]											1ª dose
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)[13,15]											1ª dose
Varicela (catapora)[14,15]											1ª dose

A TABELA ACIMA MOSTRA AS VACINAS QUE DEVEM SER APLICADAS NAS CRIANÇAS EM CADA FAIXA ETÁRIA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DRUTZ, J.E.; DURYEA T.K.; EDWARDS, M.S.; et al. Standard immunizations for children and adolescents: Overview. Up To Date. Mar 2019. Acesso em: 20/04/2019.